


ALLODOLA, CAPPELLACCIA e TOTTAVILLA



di Gianni Sanfilippo


L'allodola è un uccello passeriforme della famiglia degli *Alaudidae*, specie cacciabile in Italia. La si incontra in spazi aperti, siano essi di pianura o collinari, soprattutto nel periodo della migrazione autunnale, dove il picco massimo del passo avviene nella seconda metà di ottobre. È presente in stormi consistenti, prediligendo spesso appezzamenti di terra con colorazione simile al proprio piumaggio, che gli consente di confondersi con il suolo ed evitare di essere scoperta facilmente dai predatori. L'allodola è onnivora e si nutre di insetti e semi. La dieta contiene anche altri invertebrati come lombrichi, millepiedi e ragni. Nel 2015 è stato pubblicato sulla rivista internazionale di ornitologia "*Ringing & Migration*" lo studio compiuto in Campania sulla migrazione post nuziale dell'allodola sostenuto da FIdC e svolto dal dott. Sergio Scebba in collaborazione con l'Ufficio avifauna migratoria. Questo studio ha documentato i periodi di migrazione differenziata fra i sessi ed è oggi l'unico programma di monitoraggio sistematico standardizzato delle specie in Italia.

Andiamo quindi a "zummare" per vedere se esistono similitudini con cappellaccia e tottavilla.

Da posate e in volo



L'allodola (*Alauda arvensis*) misura 17 cm, ha parti superiori brune, fortemente striate di marrone e nerastro. Sul capo ha delle piume che possono rizzarsi e formare un cresta corta e arrotondata. Il becco è relativamente corto e il capo scuro, in contrasto con il sopracciglio bianco. Le parti inferiori sono bianche tranne il petto, che è pallido striato di marrone scuro fin sulla gola che è a base giallastra. La coda è quasi nera, con piume esterne maculate bianche ed ali con bordo chiaro. Ha il ventre bianco.



Da posate e in volo



ala cappelaccia



cappelaccia

La *cappelaccia* (*Galerida cristata*) misura 16 cm, ha un aspetto arrotondato e tozzo; ali e coda sono corte. La parte superiore appare marrone grigio uniforme, il becco è arcuato e sul capo spicca una lunga cresta caratteristica a mo' di cappello, da qui il nome "cappelaccia". La parte inferiore del corpo è fulvo crema, parzialmente striata sul petto. La coda è corta con centro scuro e margini fulvi.



cappelaccia



ala tottavilla




tottavilla

La *tottavilla* (*Lullula arborea*) misura 15 cm, è piccola, tozza, con ali larghe e coda corta e arrotondata all'estremità. Le parti superiori sono color marrone con screziature chiare, fulve e marrone scuro. Il becco è sottile, la gola chiara con strie scure e la guancia rossiccia. Sul capo ha una breve cresta di solito non sollevata e dei sopraccigli bianchi molto evidenti che si congiungono dietro la nuca. Un'altra caratteristica tipica è la macchia scura tra due parti bianche sul bordo anteriore dell'ala.



tottavilla

In volo



allodola

L'allodola è riconoscibile in volo per il bordo bianco della lunga coda che contrasta fortemente con il resto che è marrone.

Le ali sono larghe con stria bianca ai margini. In volo arriva anche a grandi altezze per poi scendere in picchiata.




cappellaccia

La cappellaccia in volo appare più rossiccia, con ali arrotondate, sotto color cuoio senza bianco sopra e sulla coda corta.

Timoniere esterne chiare. Volta con battito d'ali lento e rilassato.



In volo



La tottavilla ha un tipico volo ondulato aprendo e chiudendo le ali. Spesso si invola dagli alberi.

Ha coda corta con punta bianca.

Le ali sono più rotonde rispetto all'allodola. Non ha bordo bianco nelle ali.

Nel margine anteriore dell'ala è evidente una macchia nerastra con bordatura bianca.

Conclusioni

L'allodola rispetto alla cappellaccia ha la coda lunga bordata di bianco, così come il bordo delle ali che non sono arrotondate. Non appare rossiccia in volo come la cappellaccia che sotto le ali è color cuoio. La cappellaccia è un po' più piccola e più pallida dell'allodola, il piumaggio è meno screziato e l'aspetto è più tozzo. Il becco è più lungo e arcuato, e la cresta è più lunga che nella allodola.

L'allodola in confronto alla tottavilla è più grande, ha la cresta più pronunciata, e il becco è più grande e scuro. Le ali della tottavilla sono più arrotondate e la macchia nerastra bordata di bianco non è presente nell'allodola. La coda della tottavilla è corta con punta bianca, a differenza dell'allodola che è lunga bordata di bianco. L'allodola non ha i sopraccigli bianchi e la guancia rossiccia della tottavilla.

